

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

#### ВАРИАНТ 1

1. По причине возникновения свищи делят на:

- 1) врожденные;
- 2) травматические;
- 3) промежуточные;
- 4) окончательные.

2. Приобретенные свищи не возникают вследствие:

- 1) опухоли;
- 2) травмы;
- 3) пороков развития;
- 4) воспалительного заболевания.

3. Эпителиальные свищи требуют:

- 1) оперативного лечения;
- 2) только консервативного лечения.

4. Посттромбофлебические язвы локализуются в области:

- 1) наружной лодыжки;
- 2) внутренней лодыжки;
- 3) кресца;
- 4) надколенника.

5. Каллезные язвы характеризуются:

- 1) плотными орозоленными краями;
- 2) мягкими краями;
- 3) кровотечением;
- 4) избыточными грануляциями.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 2

1. Эпицистостома является:
  - 1) НАРУЖНЫМ СВИЩЕМ;
  - 2) ВНУТРЕННИМ СВИЩЕМ.
  
2. Гранулирующие свищи чаще требуют:
  - 1) ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ;
  - 2) КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ.
  
3. Атрофия кожи вокруг язвы характерна для:
  - 1) АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ;
  - 2) ЛУЧЕВОЙ ЯЗВЫ;
  - 3) ВАРИКОЗНО-ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ;
  - 4) ИЗЪЯЗВЛЕНИИ ОПУХОЛИ.
  
4. Верно ли, что после заполнения язвы грануляциями показаны мазевые повязки и осторожное прижигание грануляций ляписом?
  - 1) ДА;
  - 2) НЕТ.
  
5. Наружным искусственным свищем является:
  - 1) ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫЙ;
  - 2) ГАСТРОСТОМА;
  - 3) АРТЕРИОВЕНОЗНЫЙ
  - 4) УРАХУС.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 3

1. Губовидный свищ чаще:

- 1) врожденный;
- 2) приобретенный;
- 3) искусственный.

2. Колостома это .....

- 1) искусственный свищ;
- 2) врожденный свищ.

3. Для опухолевой язвы характерно:

- 1) кровотечение;
- 2) самостоятельное заживление;
- 3) бессимптомное лечение.

4. Каллезные язвы заживают:

- 1) самостоятельно;
- 2) требуют оперативного лечения;
- 3) требуют консервативного лечения.

5. Малигнизация язвы желудка это .....

- 1) когда дном язвы является соседний орган;
- 2) озлокачествление язвы;
- 3) стенозирование органа.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 4

1. Язвы желудка не могут осложняться:

- 1) кровотечением;
- 2) озлокачиванием;
- 3) сепсисом;
- 4) перфорацией.

2. Свищи не классифицируются:

- 1) по причине возникновения;
- 2) по длине;
- 3) по строению;
- 4) по отделяемому.

3. Губовидный свищ закрывается:

- 1) самостоятельно;
- 2) оперативным путем.

4. Холецистостома это .....

- 1) наружный свищ;
- 2) внутренний свищ.

5. Врожденные свищи чаще локализуются:

- 1) на передней и боковой поверхности шеи;
- 2) на задней поверхности шеи.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 5

1. Язва нижней трети голени чаще образуется в результате:

- 1) туберкулеза;
- 2) тромбоза;
- 3) актиномикоза.

2. При лечении гранулирующей язвы показано:

- 1) применение гипертонических растворов;
- 2) применение протеолитических ферментов;
- 3) индифферентные мази.

3. Свищи пупка являются :

- 1) врожденными;
- 2) приобретенными.

4. Боковые свищи шеи требуют:

- 1) оперативного лечения;
- 2) консервативного лечения.

5. Холедоходуоденостомия предусматривает создание:

- 1) внутреннего свища;
- 2) наружного свища;
- 3) губовидного свища.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 6

1. Причинами язв являются:

- 1) ТОЛЬКО РАССТРОЙСТВА КРОВООБРАЩЕНИЯ;
- 2) ТОЛЬКО ИНФЕКЦИИ;
- 3) МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ;
- 4) ТОЛЬКО ТРАВМЫ.

2. В период очищения язв от некротических тканей применяют:

- 1) ПОВЯЗКИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ, ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ;
- 2) ПРИЖИГАНИЕ ЛЯПИСОМ;
- 3) ИНДИФФЕРЕНТНЫЕ МАЗИ.

3. Для лечения трофических язв пластическое закрытие дефекта кожи.....

- 1) ПРИМЕНЯЕТСЯ;
- 2) НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

4. Постоянная колостома является:

- 1) ГРАНУЛИРУЮЩИМ СВИЩОМ;
- 2) ГУБОВИДНЫМ СВИЩОМ.

5. Пупочный свищ относится к ...

- 1) ВРОЖДЕННЫМ СВИЩАМ;
- 2) ПРИОБРЕТЕННЫМ СВИЩАМ;
- 3) ИСКУССТВЕННЫМ СВИЩАМ.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 7

1. По причине возникновения свищи делят на:

- 1) врожденные;
- 2) травматические;
- 3) промежуточные;
- 4) окончательные.

2. Эпицистостома является:

- 1) наружным свищем;
- 2) внутренним свищем.

3. Губовидный свищ чаще:

- 1) врожденный;
- 2) приобретенный;
- 3) искусственный.

4. Язвы желудка не могут осложняться:

- 1) кровотечением;
- 2) озлокачиванием;
- 3) сепсисом;
- 4) перфорацией.

5. Язва нижней трети голени чаще образуется в результате:

- 1) туберкулеза;
- 2) тромбоза;
- 3) актиномикоза.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 8

1. Приобретенные свищи не возникают вследствие:

- 1) опухоли;
- 2) травмы;
- 3) пороков развития;
- 4) воспалительного заболевания.

2. Гранулирующие свищи чаще требуют:

- 1) оперативного лечения;
- 2) консервативного лечения.

3. Колостома это .....

- 1) искусственный свищ;
- 2) врожденный свищ.

4. Свищи не классифицируются:

- 1) по причине возникновения;
- 2) по длине;
- 3) по строению;
- 4) по отделяемому.

5. При лечении гранулирующей язвы показано:

- 1) применение гипертонических растворов;
- 2) применение протеолитических ферментов;
- 3) индифферентные мази.



# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 9

1. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ СВИЩИ ТРЕБУЮТ:
  - 1) ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ;
  - 2) ТОЛЬКО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ.
  
2. АТРОФИЯ КОЖИ ВОКРУГ ЯЗВЫ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ:
  - 1) АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ;
  - 2) ЛУЧЕВОЙ ЯЗВЫ;
  - 3) ВАРИКОЗНО-ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ;
  - 4) ИЗЪЯЗВЛЕНИИ ОПУХОЛИ.
  
3. Для опухолевой язвы характерно:
  - 1) КРОВОТЕЧЕНИЕ;
  - 2) САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ;
  - 3) БЕССИМПТОМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
  
4. Губовидный свищ закрывается:
  - 1) САМОСТОЯТЕЛЬНО;
  - 2) ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ.
  
5. Свищи пупка являются :
  - 1) ВРОЖДЕННЫМИ;
  - 2) ПРИОБРЕТЕННЫМИ.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

### ВАРИАНТ 10

1. ПОСТТРОМБОФЛЕБИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В ОБЛАСТИ:

- 1) НАРУЖНОЙ ЛОДЫЖКИ;
- 2) ВНУТРЕННЕЙ ЛОДЫЖКИ;
- 3) КРЕСЦА;
- 4) НАДКОЛЕННИКА.

2. ВЕРНО ЛИ, ЧТО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЯЗВЫ ГРАНУЛЯЦИЯМИ ПОКАЗАНЫ МАЗЕВЫЕ ПОВЯЗКИ И ОСТОРОЖНОЕ ПРИЖИГАНИЕ ГРАНУЛЯЦИЙ ЛЯПИСОМ?

- 1) ДА;
- 2) НЕТ.

3. КАЛЛЕЗНЫЕ ЯЗВЫ ЗАЖИВАЮТ:

- 1) САМОСТОЯТЕЛЬНО;
- 2) ТРЕБУЮТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ;
- 3) ТРЕБУЮТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ.

4. ХОЛЕЦИСТОСТОМА ЭТО .....

- 1) НАРУЖНЫЙ СВИЩ;
- 2) ВНУТРЕННИЙ СВИЩ.

5. БОКОВЫЕ СВИЩИ ШЕИ ТРЕБУЮТ:

- 1) ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ;
- 2) КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

## ПО ТЕМЕ: СВИЩИ, ЯЗВЫ.

### 3 КУРС

#### ВАРИАНТ 11

1. КАЛЛЕЗНЫЕ ЯЗВЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ:

- 1) ПЛОТНЫМИ ОМОЗОЛЕННЫМИ КРАЯМИ;
- 2) МЯГКИМИ КРАЯМИ;
- 3) КРОВОТЕЧЕНИЕМ;
- 4) ИЗБЫТОЧНЫМИ ГРАНУЛЯЦИЯМИ.

2. НАРУЖНЫМ ИСККУСТВЕННЫМ СВИЩЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

- 1) ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫЙ;
- 2) ГАСТРОСТОМА;
- 3) АРТЕРИОВЕНОЗНЫЙ
- 4) УРАХУС.

3. МАЛИГНИЗАЦИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ЭТО ....

- 1) КОГДА ДНОМ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ СОСЕДНИЙ ОРГАН;
- 2) ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЕ ЯЗВЫ;
- 3) СТЕНОЗИРОВАНИЕ ОРГАНА.

4. ВРОЖДЕННЫЕ СВИЩИ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ:

- 1) НА ПЕРЕДНЕЙ И БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ;
- 2) НА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ.

5. ХОЛЕДОХОДУОДЕНОСТОМИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ:

- 4) ВНУТРЕННЕГО СВИЩА;
- 5) НАРУЖНОГО СВИЩА;
- 6) ГУБОВИДНОГО СВИЩА.