

Тест «Заболевания щитовидной железы»

1. Что из перечисленного не является показанием к операции при узловом зобе:

- а) сдавление трахеи и пищевода;
- б) развитие тяжелого тиреотоксикоза;
- в) риск тиреоидита;
- г) возможность малигнизации;
- д) косметический дефект.

2. Появление зоба у значительного числа лиц, живущих в одной биогеохимической области, будет определен вами как:

- а) эпидемический зоб;
- б) спорадический зоб;
- в) острый струмит;
- г) эндемический зоб;
- д) массовый тиреотоксикоз.

3. Определите оптимальный вариант лечения узлового зоба:

- а) консервативное лечение тиреоидином;
- б) иссечение узла со срочным гистологическим исследованием;
- в) выполнить энуклеацию;
- г) провести субтотальную струмэктомию;
- д) показана гемиструмэктомия или резекция доли щитовидной железы.

4. Клиническим признаком загрудинного зоба является:

- а) сужение трахеи на рентгенограмме;
- б) расширение вен шеи;
- в) одышка;
- г) одутловатость лица;
- д) все названное.

5. Что не является интраоперационным осложнением при операциях на щитовидной железе:

- а) кровотечение;
- б) воздушная эмболия;
- в) жировая эмболия;
- г) повреждение трахеи;
- д) повреждение пищевода.

6. Наиболее частым осложнением операции субтотальной струмэктомии является:

- а) повреждение возвратного нерва;
- б) рецидив тиреотоксикоза;
- в) тетания;
- г) гипотиреоз;
- д) прогрессирующий экзофтальм.

7. Определите показания к хирургическому лечению заболеваний щитовидной железы:

- 1) тиреотоксический зоб III степени;
- 2) узловой эутиреоидный зоб;
- 3) смешанный тиреотоксический зоб;
- 4) диффузный эутиреоидный зоб IV степени;
- 5) невротическая стадия тиреотоксического зоба I степени.

Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1,3,4; б) 1,2,3; в) 1,2,3,4; г) 1,2; д) всё верно.

8. У больной после операции струмэктомии возникли судороги, симптом Хвостека, симптом Труссо. Какое осложнение у больного:

- а) гипотиреоз;
- б) тиреотоксический криз;
- в) травма гортанных нервов;
- г) гипопаратиреоз;

д) остаточные явления тиреотоксикоза.

9. Симптомы тиреотоксического криза все, кроме:

- а) тахикардии;
- б) снижения пульсового артериального давления;
- в) потери сознания;
- г) возбуждения;
- д) гипертермии.

10. Что не является проявлением тиреотоксикоза?

- а) симптомы Греффе и Мебиуса;
- б) тахикардия;
- в) экзофтальм;
- г) тремор конечностей;
- д) увеличение щитовидной железы.

11. При развитии паратиреоидной тетании после струмэктомии больной показано:

- 1) гемотрансфузия;
- 2) в/в CaCl_2 ;
- 3) оксигенотерапия;
- 4) мясная диета;
- 5) микродозы йода.

Выберите правильную комбинацию ответов: а) 1,4; б) 2,3; в) 3,4; г) 2; д) все неверно.

12. Послеоперационные осложнения при операции на щитовидной железе:

- а) тиреотоксический криз;
- б) парез возвратного нерва;
- в) гипокальциемия;
- г) а+б;
- д) все названное.

13. Симптомы тиреотоксического криза все, кроме:

- а) нервно-психических расстройств;
- б) симптома Хвостека;
- в) гипертермии;
- г) тахикардии;
- д) потери сознания.

14. У больной 61 года, страдающей в течение 2-х лет узловым зобом, в последнее время отмечено быстрое увеличение узла. На скенограмме выявлен «холодный узел». Укажите наиболее вероятную причину данного состояния:

- а) кровоизлияние в узел;
- б) развитие тиреоидита;
- в) кистозная дегенерация узла;
- г) малигнизация узла;
- д) все верно.

15. Щитовидная железа секретирует:

- а) секретин; .
- б) тироксин;
- в) гастрин;
- г) пепсин;
- д) адреналин.

16. Основным компонентом для образования гормона щитовидной железы является:

- а) цинк;
- б) кальций;
- в) хлор;
- г) водород;
- д) йод.

17. Какой зоб не выделяют?

- а) эутиреоидный;
- б) тиреотоксический;
- в) узловой;
- г) диффузный;

д) реактивный.

18. Что, как правило, не входит в программу обследования больного с тиреотоксическим зобом?

а) УЗИ;

б) сканирование щитовидной железы;

в) изучение основного обмена;

г) исследование йодосодержащих гормонов в сыворотке крови;

д) ФГДС.

19. Что не характерно для тиреотоксикоза средней степени тяжести?

а) лабильность;

б) легкая возбудимость;

в) раздражительность;

г) пульс 80-100 уд/мин в покое;

д) снижение массы тела.

20. доля зоба III степени характерно.

а) определяется только при пальпации;

б) виден только при глотании;

в) виден без глотания;

г) гигантский **зоб**?

д) определяется только на УЗИ.

21. Что не характерно для* нелеченного тиреотоксикоза тяжелой степени?

а) необратимые изменения в сердце?

б) необратимые изменения в печени;

в) необратимые изменения- в почках;

г) ожирение;

д) мерцательная аритмия.