

З А Д А Ч А № 1

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:
св.Т₄ 13 пмоль/л, ТТГ 12 МкЕд/л, АТ/ТРО 1246.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 2

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:
св.Т₄ 18 пмоль/л, ТТГ 0,03 МкЕд/л, АТТГ 5.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 3

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:
ТТ₄ 160 нмоль/л, ТТГ 113 МкЕд/л, АТТРО отр.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 4

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:
ТТ₃ 7,2 нмоль/л, ТТ₄ 192 нмоль/л, ТТГ 0,05 МкЕд/л, АТ/ТРО 1609.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 5

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:
св.Т₄ 1,2 пмоль/л, ТТГ 97 МкЕд/л, АТ/ТРО 0,8.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 6

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:

св.Т₄ 2 пмоль/л, ТТГ 0,08 МкЕд/л, АТ/ТРО 2.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 7

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:

св.Т₃ 1,4 пмоль/л, св.Т₄ 1,04 пмоль/л, ТТГ 0,01 МкЕд/л, АТ/ТРО 20.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 8

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:

Т₄ св. 20 нмоль/л, ТТГ 0,042 МкЕд/л, ТСА полож.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 9

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:

св.Т₄ 10 пмоль/л, ТТГ 15 МкЕд/л, АТ/ТРО 250.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

З А Д А Ч А № 10

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:

св.Т₄ 3 пмоль/л, ТТГ 123 МкЕд/л, АТ/ТГ 25.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

ЗАДАЧА № 11

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:
св.Т₄ 20 пмоль/л, ТТГ 3,5 МкЕд/л, АТ/ТРО 1160.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.

ЗАДАЧА № 12

Оценить тироидный статус Дать заключение по 4-ём позициям:
ТТ₄ 140 пмоль/л, ТТГ 0,1 МкЕд/л, АТ/ТРО отр.

1. Гипотироз или гипертироз.
2. Первичный или центральный.
3. Манифестный или субклинический.
4. Аутоиммунный или неимунного генеза.