

Задачи по теме «Болезни щитовидной железы»

З А Д А Ч А № 1 (ЩЖ - 2 занятие)

Больная 42 лет жалуется на боль в области шеи, усиливающуюся при глотании, иррадиирующую в уши, затылок. Указанные жалобы появились около 2-х недель назад, после перенесенной ОРВИ. Общее состояние средней тяжести. Температура тела $38,4^{\circ}\text{C}$. Осмотрена отоларингологом, патологии не обнаружено.

Щитовидная железа увеличена, плотная, болезненная при пальпации, флюктуирует. Кожа над железой гиперемирована, горячая на ощупь.

Подчелюстные лимфоузлы увеличены до 1,5 см в диаметре. АД 120/80 мм.рт.ст., пульс 98 уд/мин. Дыхание везикулярное. Живот мягкий безболезненный. В общем анализе крови лейкоцитоз $26 \times 10^9 / \text{л}$, СОЭ 18 мм/ч.

1. Поставить предварительный диагноз и назначить необходимые дополнительные обследования.
2. С какими заболеваниями проведете дифференциальный диагноз?
3. Назначить план лечения.

З А Д А Ч А № 2 (ЩЖ - 2 занятие)

У больной в течение недели беспокоят боли в области шеи. Отмечает незначительный подъём температуры по вечерам до $37,5 - 38^{\circ}\text{C}$, артралгии.

Лабораторно: эритроциты $4,0 \times 10^{12} / \text{л}$, гемоглобин - 119 г/л, лейкоциты - $10,2 \times 10^9 / \text{л}$, СОЭ - 58 мм/час.

1. Ваш предварительный диагноз.
2. С какими состояниями нужно проводить дифференциальный диагноз?
3. Составить план обследования и лечения.

З А Д А Ч А № 3 (ЩЖ - 2 занятие)

Больная 43 лет жалуется на затруднение при глотании, повышенную утомляемость, увеличение массы тела, замедленную речь, огрубение голоса.

Увеличение передней поверхности шеи отметила 10 лет назад. Не лечилась.

Объективно: рост 169 см, вес 88 кг. Кожа сухая, грубая, холодная на ощупь.

Щитовидная железа увеличена, плотная, бугристая, воротникообразная. Пульс 56 уд/мин, ритмичный. АД 115/60 мм.рт.ст. Сердечные тоны глухие, перкуторно границы сердца расширены.

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз.
2. Назначить необходимые исследования для уточнения диагноза.
3. Провести дифференциальную диагностику.
4. Назначить лечение.

З А Д А Ч А № 4 (ЩЖ - 2 занятие)

Больная 25 лет жалоб не предъявляет. Во время профилактического осмотра выявлено увеличение щитовидной железы 2 степени. Ранее за медицинской помощью по этому поводу не обращалась. Проживает в г. Гомеле.

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Рост 180 см, вес 86 кг.

Щитовидная железа диффузно увеличена до 2 степени, мягкой консистенции, подвижная, безболезненная при пальпации. Пульс 76 уд/мин, ритмичный, АД 120/70 мм.рт.ст. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы.

1. Ваш предварительный диагноз?

2. Назначить дополнительные методы обследования для его подтверждения.

3. Лечение.

З А Д А Ч А № 5 (ЩЖ - 2 занятие)

Больная 44 лет жалуется на постоянную слабость, боли в области сердца, сердцебиение, раздражительность, резь в глазах. За последние 3 месяца похудела на 5 кг.

Объективно: общее состояние средней тяжести. Рост 166 см, вес 58 кг. Кожные покровы обычной окраски, влажные, щитовидная железа диффузно увеличена до 2 ст., плотная, подковообразная. Пульс 100 уд/мин., АД 140/70 мм.рт.ст. Сердечные тоны ритмичные, систолический шум на верхушке. На сонограмме: увеличение размеров обеих долей и перешейка щитовидной железы, неравномерность эхоструктуры, снижение эхогенности. Отмечается двусторонний экзофтальм.

1. Поставить предварительный диагноз.

2. Назначить дополнительные обследования.

3. Лечение.

З А Д А Ч А № 6 (ЩЖ - 2 занятие)

Больная 54 лет жалуется на чувство сдавления в области шеи, усиливающееся в положении лежа, першение в горле.

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Щитовидная железа увеличена в пределах 1 ст. В правой доле пальпируется узловое образование до 1,5 см в диаметре. Периферические лимфоузлы не увеличены. По другим органам без особенностей.

1. Ваш диагноз.

2. План обследования.

3. Лечение.

З А Д А Ч А № 7 (ЩЖ - 2 занятие)

Больная 50 лет предъявляет жалобы на прогрессирующую слабость, снижение слуха, памяти, внимания. За последний месяц прибавила в весе 4 кг. Состоит на диспансерном учете по поводу ревматоидного артрита. Щитовидная железа не пальпируется. Сонографически уменьшена в объеме на 56%, эхогенность снижена, структура неравномерная с фиброзной тяжистостью.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Назначить план обследования.
3. Лечение.

З А Д А Ч А № 8 (ЩЖ - 2 занятие)

У женщины через 4 месяца после родов появились жалобы на зябкость, запоры, огрубение голоса, появление плотных отеков.

Щитовидная железа при пальпации плотная, подковообразная, увеличена в пределах 1 ст. Периферические лимфоузлы не увеличены. Пульс 56 уд/мин; АД 90/70 мм.рт.ст.

1. Ваш предварительный диагноз.
2. План обследования.
3. Лечение.

З А Д А Ч А № 9 (ЩЖ - 2 занятие)

Больной 35 лет поступил в клинику с жалобами на боли в области шеи, иррадиирующие в челюсть и ухо. Болеет в течение недели. Накануне перенес вирусную инфекцию.

Объективно: общее состояние средней тяжести. Температура 37,9⁰С. Кожные покровы влажные, теплые. Щитовидная железа резко болезненна при пальпации, не увеличена. Пульс 100 уд/мин. АД 140/60 мм.рт.ст. Сердечные тоны ослаблены. На верхушке систолический шум.

Тироидный статус: св. Т₄ 26 пмоль/л, ТТГ 0,3 МкЕд/л.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. План обследования.
3. С какими заболеваниями проведете дифференциальную диагностику?
4. Лечение.

З А Д А Ч А № 10 (ЩЖ - 2 занятие)

Больной 58 лет жалоб не предъявляет. При осмотре щитовидная железа увеличена. В правой доле пальпируется узел до 2 см в диаметре. Периферические лимфоузлы не увеличены.

Тироидный статус: св. Т₄ 8 нмоль/л, ТТГ 4 МкЕд/л, АТ/ТГ 1:50.

1. Ваш диагноз?
2. С какой патологией проведете дифференциальную диагностику?
3. План обследования.

З А Д А Ч А № 11 (ЩЖ - 2 занятие)

Больной 30 лет состоит на диспансерном учете по поводу хронического тонзиллита, после обострения которого появились жалобы на резкую болезненность в проекции щитовидной железы. Боли иррадиировали в ухо, челюсть.

Объективно: общее состояние средней тяжести. Температура 38,6⁰С. Щитовидная железа резко болезненна при пальпации. Периферические лимфоузлы не увеличены. По остальным органам и системам без особенностей. В общем анализе крови лейкоциты – $7,2 \times 10^9/\text{л}$; СОЭ 45 мм/час

1. Ваш предварительный диагноз?
2. С какой патологией проведете дифференциальную диагностику?
3. План обследования.
4. Лечение.

З А Д А Ч А № 12 (ЩЖ - 2 занятие)

Больной 48 лет предъявляет жалобы на нарастающую слабость, снижение памяти и внимания, огрубение голоса, увеличение глазных яблок, чувство "песка в глазах", слезотечение.

Объективно: общее состояние средней тяжести. Щитовидная железа увеличена в пределах 2 ст. Плотная, воротникообразная. Периферические лимфоузлы не увеличены. Отмечается выраженный экзофтальм. Отёчность и пигментация век.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. План обследования.
3. Лечение.